

FUSILADE FORTE

ERBICID GRAMINICID SELECTIV



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 2019 /26.10.1999

CULTURA:

MULTIPLE

150

CONȚINE:

G/L FLUAZIFOP-P-BUTIL

TIMP DE PAUZĂ:



**28 – 90
ZILE**

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

CONCENTRAT EMULSIONABIL
(EC)



TERMEN DE VALABILITATE



MOD DE ACȚIUNE

Fusilade Forte controlează buruienile monocotiledonate anuale și perene, inclusiv *Sorghum halepense* (**Costreiu**) din rizomi, răsărite în momentul aplicării.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURĂ	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZĂ L/HA	PERIOADA DE APLICARE	TIMP DE PAUZĂ(ZILE)
 FLOAREA - SOARELUI	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum</i> din seminte)	0.8 L/Ha	Postemergent	90
	Costrei (<i>Sorghum</i>) din rizomi (când plantele de costrei au înălțimea mai mică de 15 cm)	1 L/Ha		
	Costrei (<i>Sorghum</i>) din rizomi (când plantele de costrei au înălțimea între 15-25 cm)	1.3 L/Ha		
CARTOF	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i> , <i>Setaria viridis</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i>)	0.8-1 L/Ha	Postemergent aplicare doar până la BBCH 51	56
	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Avena fatua</i>)	1 L/Ha		



FUSILADE® FORTE

CULTURĂ	BURUIENI COMBATUTE	DOZĂ L/HA	PERIOADA DE APLICARE	TIMP DE PAUZĂ(ZILE)
CARTOF	Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i> până la 10-15 cm, <i>Sorghum halepense</i> mai mic de 20-25 cm înălțime)	1.3 L/Ha	Postemergent aplicare doar până la BBCH 51	56
	Buruieni monocotiledonate perene (<i>Agropyron repens</i> până la 25 cm înălțime, <i>Sorghum halepense</i> până la 25-35 cm înălțime)	1.5 L/Ha		
SFECLĂ DE ZAHĂR	Buruieni monocotiledonate anuale (până la faza de înfrățire)	0.8 L/Ha	Postemergent	56
	Buruieni monocotiledonate perene (până la 15 cm înălțime)	1.0-1.3 L/Ha		
RAPIȚĂ	Buruieni monocotiledonate anuale (la 2-4 frunze) (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Sorghum</i> din seminte)	0.8	Postemergent	90
	Costrei (<i>Sorghum halepense</i>) din rizomi (la faza optima de 15-20 cm)	1 L/Ha		
MĂR PE ROD	Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene la înălțime mai mica de 15 cm	1 L/Ha	Postemergent	28
	Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene la înălțimea de 15-25 cm	1.3 L/Ha		
PLANTAȚII VITICOLÉ	Buruieni monocotiledonate anuale	1.3 L/Ha	Postemergent	28
CĂPȘUN	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/Ha	Postemergent	42
	Buruieni monocotiledonate perene	1.3 L/Ha		
PEPINIERE POMICOLE CI ȘI CII	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/Ha	Postemergent	28
	Buruieni monocotiledonate perene	1.3 L/Ha		
ARBUȘTI FRUCTIFERI (MUR, ZMEUR)	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/Ha	Postemergent	45
	Buruieni monocotiledonate perene	1.3 L/Ha		
ARBUȘTI FRUCTIFERI (COACĂZ, AFIN)	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/Ha	Postemergent	90
	Buruieni monocotiledonate perene	1.3 L/Ha		

FUSILADE® FORTE

CULTURĂ	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZĂ L/HA	PERIOADA DE APLICARE	TIMP DE PAUZĂ(ZILE)
ÎN, MUȘTAR	Buruieni monocotiledonare anuale și perene	0.8-1.25 L/Ha	Postemergent Până înainte de BBCH 50 (înainte de înflorit)	90
FASOLE DE CÂMP, MAZĂRE, LUPIN	Buruieni monocotiledonare anuale și perene	0.8-1.6 L/Ha	Postemergent Până înainte de BBCH 50 (în	90

TEHNICA DE APLICARE



Produsul Fusilade Forte se aplică prin tratamente în timpul vegetației, postemergent atunci când buruienile sunt răsărite și în stadiul de creștere activă. Momentul optim de aplicare este de 1-2 frunze până la înfrățire pentru buruienile anuale și peste 4 frunze până la înălțimea de 20-25 cm pentru buruienile perene. Doza se ajustează în funcție de gradul de infestare și înălțimea buruienilor, conform tabelului cu utilizări omologate. La ceapă se aplică după formarea de 2-3 frunze adevărate sau după efectuarea testului cu cristal violet, pentru a verifica existența stratului de pruina/ceară pe suprafața plantelor. Dacă înainte de tratament plouă, se așteaptă 48-72 ore până la efectuarea tratamentului, pentru formarea pruinei pe plante.

AVANTAJE

- Conține Tehnologia avansată ISOLink ce include surfactanți și penetranți în formulare, atribuind produsului **Fusilade Forte** proprietatea de a se dizolva mai repede în apă, preluarea mai bună și mai rapidă a substanței active în plante, ceea ce duce la un control foarte bun și rapid asupra buruienilor graminee.
- Controlează bine buruienile greu de combătut – **Fusilade Forte** este foarte eficient asupra buruienilor *Agropyron repens* (**Pir târâtor**), *Avena fatua* (**Ovăz sălbatic**), *Digitaria sanguinalis* (**Meișor**), *Echinochloa crus-galli* (**Iarbă bărbaoasă**), *Setaria glauca* (**Mohor**), *Setaria viridis* (**Mohor verde**), *Sorghum halepense* (**Costrei**).
- Unealtă bună în managementul combaterii rezistenței – poate fi aplicat la un număr mare de culturi care intră în rotație și astfel permite utilizarea unui program variat.

ROTAȚIA CULTURILOR

Nu există restricții în ceea ce privește rotația culturilor.