



GRUP 11|3 FUNGICIDE UFI: ERAA-80CM-400Q-DMWN

ATENȚIE

Fraze de pericol:

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H302+H332: Nociv în caz de înghițire sau inhalare.
H351: Susceptibil de a provoca cancer.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P261: Evitați să inspirați ceața sau vaporii.
P264: Spălați-vă pielea bine după utilizare.
P280: A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P304 + P340 + P312: ÎN CAZ DE ÎNHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic dacă nu vă simțiți bine.
P331 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P391: Colocați scurgerea de produs.
P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Informații suplimentare pentru protecția sănătății umane:
Interval de re-entrare în cultura tratată: 24 de ore după tratament.

Informații suplimentare pentru protecția mediului înconjurător:

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăta echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață!

Numele produselor marcate cu ® sau ™, sigla SYNGENTA și elementele alăturate sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta



PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE (EUH401). PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ. Cititi instrucțiunile alăturate înainte de folosire. Cititi toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului. Culturi omologate: tomate, vinete, ardei, fasole, varză, varză de Bruxelles, castraveți, morcov, păstârnac, pătrunjel, hrean, conopidă, brocoli, dovleci, pepeni galbeni, praz, ceapă, usturoi, salată, mazăre, căpsun, zmeură, pepene verde.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Proprietăți fizico-chimice: Produsul este o suspensie fină, de culoare galbenă, cu miros aromatic, omogenă, mobilă, cu tendință de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

În România produsul este omologat la:

Cultura	Agentul dăunător	Doza	Volum de apă min.- max.	Număr maxim tratamente	Interval între tratamente (min.)	Temp de pauză până la recoltare
Tomate (câmp, sere și solarii)	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Phytophthora infestans</i> , <i>Cladosporium fulvum</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria alternata</i>	1 l/ha	1000 litri/ha	3	7-10 zile	7 zile
Vinete (câmp, sere și solarii)	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Phytophthora parasitica</i> , <i>Cladosporium fulvum</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria alternata</i>	1 l/ha	1000 litri/ha	3	7-10 zile	7 zile
Ardei (câmp, sere și solarii)	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Phytophthora capsici</i> , <i>Cladosporium fulvum</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria alternata</i>	1 l/ha	1000 litri/ha	2	8-10 zile	7 zile
Fasole verde (câmp)	<i>Peronospora viciae</i> , <i>Erysiphe polygoni</i>	1 l/ha	300-1200 litri/ha	2	12 zile	7 zile
Fasole (câmp)	<i>Peronospora viciae</i> , <i>Erysiphe polygoni</i>	1 l/ha	300-1200 litri/ha	2	12 zile	7 zile
Varză (câmp)	<i>Mycosphaerella brassicicola</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Erysiphe cruciferarum</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Albugo candida</i>	1 l/ha	200-600 litri/ha	2	14 zile	21 de zile
Varză de Bruxelles (câmp)	<i>Mycosphaerella brassicicola</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Erysiphe cruciferarum</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Albugo candida</i>	1 l/ha	200-600 litri/ha	2	14 zile	21 de zile
Castraveți (câmp și sere)	<i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Cladosporium cucumerium</i>	1 l/ha	500-1500 litri/ha	3	10 zile	3 zile
Morcov, Păstârnac, Pătrunjel (câmp)	<i>Alternaria dauci</i> , <i>Erysiphe heraclei</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1 l/ha	200-600 litri/ha	3	14 zile	14 zile
Hrean (câmp)	<i>Mycosphaerella brassicicola</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Erysiphe cruciferarum</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Albugo candida</i>	1 l/ha	200-600 litri/ha	3	14 zile	14 zile
Conopidă (câmp)	<i>Mycosphaerella brassicicola</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Erysiphe cruciferarum</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Albugo candida</i>	1 l/ha	200-600 litri/ha	2	14 zile	14 zile
Broccoli (câmp)	<i>Mycosphaerella brassicicola</i> , <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Erysiphe cruciferarum</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Albugo candida</i>	1 l/ha	200-600 litri/ha	2	12 zile	14 zile
Teiină (câmp și sere)	<i>Erysiphe heraclei</i> , <i>Septoria api</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Alternaria dauci</i>	1 l/ha	200-1000 litri/ha	3	14 zile	14 zile
Dovleci (câmp și sere)	<i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Cladosporium cucumerium</i>	1 l/ha	500-1500 litri/ha	3	10 zile	3 zile
Pepene galben (câmp și sere)	<i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Cladosporium cucumerium</i>	1 l/ha	500-1500 litri/ha	3	8 zile	3 zile
Praz (câmp)	<i>Alternaria porii</i> , <i>Puccinia allii</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Cladosporium allii</i> , <i>Phytophthora porii</i>	1 l/ha	200-1000 litri/ha	2	12 zile	21 de zile
Salată (câmp)	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Cercospora lactucae-sativa</i> , <i>Bremia lactucae</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1 l/ha	300-1200 litri/ha	2	7 zile	7 zile
Salată (sere)	<i>Alternaria brassicae</i> , <i>Cercospora lactucae-sativa</i> , <i>Bremia lactucae</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	0,8 l/ha	300-1200 litri/ha	2	7 zile	14 zile
Ceapă semănată direct, Ceapă din apargic, Usturoi (câmp)	<i>Alternaria porii</i> , <i>Puccinia allii</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Cladosporium allii</i> , <i>Phytophthora porii</i>	1 l/ha	300-600 litri/ha	1	14 zile	14 zile
Ceapă verde (câmp)	<i>Alternaria porii</i> , <i>Puccinia allii</i> , <i>Peronospora destructor</i> , <i>Cladosporium allii</i> , <i>Phytophthora porii</i>	1 l/ha	300-600 litri/ha	1	-	7 zile
Mazăre (câmp)	<i>Ascochyta pisi</i> , <i>Peronospora viciae</i> , <i>Mycosphaerella pinodes</i> , <i>Erysiphe pisi</i>	1 l/ha	300-1200 litri/ha	2	14 zile	14 zile
Căpsun, Zmeură (câmp și sere)	<i>Podosphaera aphanis</i> , <i>Colletotrichum acutatum</i> , <i>Mycosphaerella fragariae</i> , <i>Gnomonia comari</i>	1 l/ha	300-1200 litri/ha	2	7 zile	3 zile
Pepene verde (câmp și sere)	<i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Cladosporium cucumerium</i>	1 l/ha	500-1500 l/ha	3	8 zile	3 zile

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 021-526.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Descrierea produsului:

ORTIVA TOP este un fungicid foliar preventiv și curativ, cu spectru larg de acțiune împotriva agenților patogeni, fiind recomandat să se utilizeze la culturile legumicole.

Mod de acțiune:

ORTIVA TOP conține două ingrediente active (azoxistrobin și difenconazol) cu activitate de contact și sistemică locală și translamară.

Azoxystrobin:

- Acționează ca inhibitor al respirației mitocondriale, blocând ciclul energetic al patogenului.
- Intervine în ciclul biologic al ciupercii. În principal în timpul germinării sporilor și în timpul întinerii penetrării în țesuturile plantei.
- Prezintă preluare graduală și activitate sistemică locală (translamară) în frunze.
- Activitate preventivă

Difenconazol:

- Prezintă acțiune preventivă și curativă
- Acționează prin blocarea biosintezei steroloiz în membranele celulare ale fungilor. Acțiune sistemică locală și ușoară translocare acropetală.

Recomandări de utilizare:

ORTIVA TOP se aplică preventiv și/sau la avertizare, când condițiile de climă sunt favorabile pentru dezvoltarea bolilor.

Monitorele de aplicare corespund următoarelor faze de vegetație:

- **tomate** - apariția celei de a-6-a frunze până când 70% din fructe s-au maturat.
- **vinete, ardei** - apariția celei de a-10 frunze, până la coacerea deplină.
- **fasole** - de la începutul înfloririi, până când 70% din păstăi ating dimensiunea normală
- **varză și varză de Bruxelles** - de la începutul formării căpătâșii, până la atingerea mărimii normale.
- **conopidă și broccoli** - de la începutul dezvoltării mugurilor laterali, până la prima înflorință vizibilă.
- **morcov, păstârnac, pătrunjel, hrean** - de la începutul formării rădăcinii, până la atingerea dimensiunilor normale;
- **teiină** - de la începutul formării rădăcinii, până când aceasta este la 80% din dimensiune normală.
- **dovleci și castraveți** - de la prima înflorință, până la maturare deplină;
- **praz** - de la începutul îngroșării frunzelor bazale, până la maturitate;
- **salată** - de la dezvoltarea completă a roziei de frunze, până la maturare;
- **pepeni galbeni și pepeni verzi** - de la apariția primei ramificații a tulpinii principale, până la maturarea fructelor;
- **căpsun și zmeură** - primele fructe deschise (încăput de înfloriri), până la maturare, a-2-a recoltare;

Ceapă semănată direct, ceapă din apargic, usturoi

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

Ceapă verde

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

Mazăre

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

Căpsun, zmeură

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

Pepene verde

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

se va evita efectuarea tratamentelor în condiții de temperaturi și umidități relative foarte ridicate sau foarte scăzute.

Managementul prevenirii apariției rezistenței:

Pe durata unui sezon se recomandă aplicarea a maxim 2 - 3 tratamente cu ORTIVA TOP, în funcție de cultură, conform informațiilor din tabelul cu utilizările pentru care este omologat produsul. Produsul se va utiliza în alternanță cu produse din alte grupe chimice.

Mod de aplicare:

ORTIVA TOP conține două ingrediente active (azoxistrobin și difenconazol) cu activitate de contact și sistemică locală și translamară.

Azoxystrobin:

• Acționează ca inhibitor al respirației mitocondriale, blocând ciclul energetic al patogenului.

• Intervine în ciclul biologic al ciupercii. În principal în timpul germinării sporilor și în timpul întinerii penetrării în țesuturile plantei.

• Prezintă preluare graduală și activitate sistemică locală (translamară) în frunze.

• Activitate preventivă

Difenconazol:

• Prezintă acțiune preventivă și curativă

• Acționează prin blocarea biosintezei steroloiz în membranele celulare ale fungilor. Acțiune sistemică locală și ușoară translocare acropetală.

Recomandări de utilizare:

ORTIVA TOP se aplică preventiv și/sau la avertizare, când condițiile de climă sunt favorabile pentru dezvoltarea bolilor.

Monitorele de aplicare corespund următoarelor faze de vegetație:

- **tomate** - apariția celei de a-6-a frunze până când 70% din fructe s-au maturat.
- **vinete, ardei** - apariția celei de a-10 frunze, până la coacerea deplină.
- **fasole** - de la începutul înfloririi, până când 70% din păstăi ating dimensiunea normală
- **varză și varză de Bruxelles** - de la începutul formării căpătâșii, până la atingerea mărimii normale.
- **conopidă și broccoli** - de la începutul dezvoltării mugurilor laterali, până la prima înflorință vizibilă.
- **morcov, păstârnac, pătrunjel, hrean** - de la începutul formării rădăcinii, până la atingerea dimensiunilor normale;
- **teiină** - de la începutul formării rădăcinii, până când aceasta este la 80% din dimensiune normală.
- **dovleci și castraveți** - de la prima înflorință, până la maturare deplină;
- **praz** - de la începutul îngroșării frunzelor bazale, până la maturitate;
- **salată** - de la dezvoltarea completă a roziei de frunze, până la maturare;
- **pepeni galbeni și pepeni verzi** - de la apariția primei ramificații a tulpinii principale, până la maturarea fructelor;
- **căpsun și zmeură** - primele fructe deschise (încăput de înfloriri), până la maturare, a-2-a recoltare;

Ceapă semănată direct, ceapă din apargic, usturoi

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

Ceapă verde

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

Mazăre

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

Căpsun, zmeură

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

Pepene verde

Intervalul de aplicare este de 14 zile.

iritată persistă apleți la medic. Spălați hainele contaminate înainte de re folosire. Se recomandă purtarea mănușilor de cauciuc. Material adecvat: cauciuc nitrilic.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Încăpărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apleți imediat la medic.

În caz de înhalare: se va muta accidentalul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau aprins se va efectua respirație artificială. Trebuie pacientul la căldură și în repaus total. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va aplea imediat la medic unde se va prezenta această etichetă sau ambalajul produsului. NU SE VA PROVOCA VOMĂ.

Slat medical: nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor: Produse pentru stingerea incendiului - incendii minore

Se va folosi apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, agent de stingere sub formă de pulbere sau bioxid de carbon. Produse pentru stingerea incendiului - incendii majore

Spumă rezistentă la alcoolul sau apă pulverizată

Nu se va folosi un jet de apă puternic care ar putea împrăști și răspândi focul. Deoarece produsul conține componente organice combustibile, un incendiu va produce un fum dens și negru conținând produse de combustie periculoși. Inhalarea de produse de descompunere periculoși poate determina probleme grave de sănătate. Recomandări destinate pompierilor

Se va purta îmbrăcăminte completă de protecție personală și aparat respirator autonom. Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare. Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise aliate în apropierea unor surse de incendiu.

Combaterarea integrată:

După aplicare sau la sfârșitul zilei se va apăla echipamentul de stropire cu apă curată. Apa de spălare ca și restul de soluție rămas se diluează în raport de 1 la 10 cu apă curată și se aplică pe cultura tratată.

Compatibilitatea: Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultați tabelele cu compatibilități și utilizați un test pe cultură respectivă.

Spălarea echipamentului:

După aplicare sau la sfârșitul zilei se va apăla echipamentul de stropire cu apă curată. Apa de spălare ca și restul de soluție rămas se diluează în raport de 1 la 10 cu apă curată și se aplică pe cultura tratată.

Compatibilitatea: Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultați tabelele cu compatibilități și utilizați un test pe cultură respectivă.

Măsuri de igienă și protecție a muncii: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca.

A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semintele sau ambalajele acestora.

Protejarea mâinilor se face prin purtarea mănușilor de protecție cu mănușile caracteristice.

Material adecvat: Cauciuc nitrilic

Temp de penetrare: > 480 min

Grosime: 0,5 mm

Primul ajutor: se recomandă să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa cu date de securitate atunci când sunați la numărul de urgență Syngenta sau la medic, sau când mergeți pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcăminte contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă

în vigoare. Se va curăța cu grijă suprafața contaminată. Se va curăța cu detergenți. Se vor evita solvenții. Se va conserva și elimina apa de spălare contaminată.

Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit (pentru produse lichide). Ambalajele de plastic vor fi colectate separat prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecție a Plantelor din România - SCAPA. Ambalajele colectate prin acest program sunt înscrisurate cu sigla SCAPA. Telefonat: la 0800.800.211 (apel gratuit), adresa email scapa@ecorecycling.ro sau consultați www.aprom.ro, Agenția Județeană de Protecția Mediului sau distribuitorii locali pentru informații despre cel mai apropiat punct de colectare și calendarul de lucru al SCAPA. Nu re folositi ambalajele goale în alte scopuri!

Condiții de manipulare, depozitare și transport: Produsul se va păstra la adăpost de soare și umiditate, într-un loc bine aerisit și încaut, departe de alimente și furaje, în ambalajele originale închise etans.

Temperatura de depozitare este între +5°C și +25°C. Se va feri de îngheț.

Termen de valabilitate: Produsul este valabil 3 ani de la data fabricației în condițiile de păstrare mai sus menționate.

În atenția utilizatorului: Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorectă manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice ale produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii de combatere integrată care pot să prevină apariția organismelor rezistente. Oare nerecursarea la indicările de mai sus poate conduce la diminuarea eficacității sau la un esec total.

Relații suplimentare se pot obține de la: Oficiile Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București, tel.: +40 21 526 00 00.

® Marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta

© 2025 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați:

Spitalul Clinic de Urgență București

Telefon de urgență: +40 (21) 599 23 00 sau 021.112 (Apelabil 24h/7z)

Adresa: Calea Floresca nr. 8, sector 1, București

E-mail: ati_2@urgentafloresca.ro

Sau: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Ghigora Alexandrescu” Telefon de urgență: Tel. 021.210.62.82; Tel. 021.210.61.83

Adresa: Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, București, E-mail: contact@spitalulghigoraalexandrescu.ro

Sau: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență, Telefon de urgență: +40 (21) 5295277