Scanează-mă

# Thiovit Jet® 80WG

syngenta®

**GRUP M02 FUNGICID**

**Deținătorul omologării:** Syngenta Agro S.R.L., România.
**Producător:** Syngenta Crop Protection AG, Elveția.
**Compania responsabilă de introducerea pe piață:** Syngenta Agro SRL, Cladirea London Office Building, etaj 6, Splaiul Independenței Nr. 319H, 060044, Sectorul 6, Bucuresti, România , tel. 021-528.12.00;
tel urgență: 021-529.25.77; tel consiliere tehnică: 021- 528.12.77
**Fungicid**
**Formulare:** Microgranule dispersabile în apă.
**Substanță activă:** 80% g/g (800 g/kg) sulf.
**Omologat în România** cu Certificatul de Omologare nr. 2149/25.07.2002.
**Termen de valabilitate:** 5 ani de la data fabricației, păstrat în ambalaje originale, închise etanș.
**Depozitare:** Se va păstra la adăpost de căldură și umezeală.
Temperatura de depozitare între 0°C și +30°C. Se va feri de îngheț.

**Fraze de precauție:**
**P102:** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
**P270:** A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

**Informații suplimentare pentru protecția sănătății umane:**
Poate forma o combinație inflamabilă de praf și aer.

**Informații suplimentare pentru protecția mediului înconjurător:**
**SP1** - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE (EUH401). PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ/HORTICULTURĂ. **Citiți instrucțiunile alăturate înainte de folosire. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului. Culturi omologate:** măr, castraveți, viță-de-vie, cereale (grâu, orz, triticale, secară), tutun, sfeclă de zahăr, morcov, ardei, pepeni verzi, pepeni galbeni, dovlecei, dovleac, păr, gutui, piersic, nectaric, cais, prun, tomate, vinete, trandafiri.

®

SCAPA

Numele produselor marcate cu ® sau ™, sigla SYNGENTA, și elementele alăturate sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
**Proprietăți fizico-chimice:** THIOVIT JET 80 WG se prezintă sub formă de granule fine, fără tendință de sfărâmare, de culoare maro.
**Mod de acțiune:** THIOVIT JET 80 WG este un fungicid de contact. Acționează asupra patogenilor prin întreruperea procesului de formare a noilor celule.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
În România produsul este omologat pentru următoarele utilizări:

| Cultura | Agentul dăunător | Doza | Perioada de aplicare | Număr maxim de tratamente | Interval minim între tratamente | Volum de apă | Timp de pauză până la recoltare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Măr | Podosphaera leucotricha, Venturia inaequalis, Venturia pirina (efect secundar asupra acarienilor) | 5-8 kg/ha (în funcție de nivelul de infestare) | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 litri/ha | 7 zile |
| Castraveți | Sphaerotheca fuliginea, Erysiphae cichoracearum (efect secundar asupra acarienilor) | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 litri/ha | 1 zi |
| Viță de vie | Uncinula necator, Phomopsis viticola (efect secundar asupra acarienilor) | 3 kg/ha | BBCH 01-16 | 2-3 | 7-14 zile | 300-1600 litri/ha | 28 de zile |
| Grâu | Erysiphe graminis | 8 kg/ha | La apariția primelor simptome (BBCH 15-69) | 1-2 | 7-21 zile | 200-300 litri/ha | 35 de zile |
| Tutun | Erysiphe cichoracearum | 0.3 - 0.4% | La apariția primelor simptome | 2-3 | 7-14 zile | 600 litri/ha | 14 zile |
| Sfeclă de zahăr | Erysiphe betae | 5 kg/ha | La apariția primelor simptome (BBCH 15-49) | 2-3 | 8-10 zile | 200-500 litri/ha | 14 zile |
| Ardei | Leveillula taurica | 4 kg/ha | La apariția primelor simptome | 2-3 | 7-14 zile | 1000 litri/ha | 1 zi |
| Morcov | Erysiphe umbeliferarum | 4 kg/ha | Pe tot parcursul sezonului | 2-4 | 7-14 zile | 1000 litri/ha | 5 zile |
| Pepeni verzi | Erysiphe cichoracearum (efect secundar asupra acarienilor) | 4 kg/ha | Pe tot parcursul sezonului | 2-3 | 7-14 zile | 300-500 litri/ha | 1 zi |
| Trandafir | Sphaerotheca pannosa | 4 kg/ha | La apariția primelor simptome | 2-3 | 5-14 zile | 1000 litri/ha | - |
| Păr, Gutui | Podosphaera leucotricha, Venturia inaequalis, Venturia pirina (efect secundar asupra acarienilor) | 5-8 kg/ha (în funcție de nivelul de infestare) | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 litri/ha | 7 zile |
| Piersic | Sphaerotheca pannosa (efect secundar asupra acarienilor) | 5-8 kg/ha (în funcție de nivelul de infestare) | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 litri/ha | 7 zile |
| Cais | Sphaerotheca pannosa (efect secundar asupra acarienilor) | 5-8 kg/ha (în funcție de nivelul de infestare) | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 litri/ha | 7 zile |
| Nectarin | Sphaerotheca pannosa (efect secundar asupra acarienilor) | 5-8 kg/ha (în funcție de nivelul de infestare) | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 litri/ha | 7 zile |
| Prun | Sphaerotheca pannosa (efect secundar asupra acarienilor) | 5-8 kg/ha (în funcție de nivelul de infestare) | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 litri/ha | 7 zile |
| Cereale (orz, triticale, secară) | Erysiphe graminis (efect secundar asupra acarienilor) | 8 kg/ha | La apariția primelor simptome (BBCH 15-69) | 1-2 | 7-21 zile | 200-300 litri/ha | 35 de zile |
| Tomate (câmp) | Leveillula taurica (efect secundar asupra acarienilor) | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 litri/ha | 1 zi |
| Vinete (câmp) | Leveillula taurica (efect secundar asupra acarienilor) | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 litri/ha | 1 zi |
| Pepene galben (câmp) | Erysiphe cichoracearum (efect secundar asupra acarienilor) | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 litri/ha | 1 zi |
| Dovlecei (câmp) | Erysiphe cichoracearum (efect secundar asupra acarienilor) | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 litri/ha | 1 zi |
| Dovleac (câmp) | Erysiphe cichoracearum (efect secundar asupra acarienilor) | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 litri/ha | 1 zi |

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

**Recomandări de utilizare:**
**Măr, Gutui, Păr:** Primul tratament se aplică la apariția primelor simptome sau la avertizare. Celelalte tratamente se aplică la un interval de 7-14 zile în funcție de presiunea de infecție în intervalul de la apariția frunzelor și până la coacerea definitivă. Nu se mai aplică după ce fructele și-au schimbat culoarea. Doza mică se aplică atunci când nivelul de infestare este redus, iar doza mare se aplică la un nivel ridicat de infestare.
**Viță de vie:** Tratamentele se aplică preventiv sau la avertizare. Tratamente curative, 3 aplicări la interval de 7-14 zile, imediat ce au fost observate primele simptome de făinare. Produsul se poate aplica în intervalul de la umflarea mugurilor și până la apariția celei de-a 6-a frunze.
**Piersic, Nectarin, Cais, Prun:** Primul tratament se aplică la apariția primelor simptome sau la avertizare. Celelalte tratamente se aplică la un interval de 7-14 zile în funcție de presiunea de infecție în intervalul de la apariția frunzelor și până la coacerea definitivă. Nu se mai aplică după ce fructele și-au schimbat culoarea. Doza mică se aplică atunci când nivelul de infestare este redus, iar doza mare se aplică la un nivel ridicat de infestare.
**Tomate, Vinete, Castraveți, Pepene galben, Dovlecei, Dovleac:** Primul tratament se aplică la apariția primelor simptome sau la avertizare. Celelalte tratamente se aplică la un interval de 7-14 zile în funcție de presiunea de infecție în intervalul de la apariția celei de-a 3-a frunze și până la 70% fructe mature.
**Cereale:** Primul tratament se aplică la apariția primelor simptome sau la avertizare. Cel de-al 2-lea tratament se aplică la un interval de 7-21 zile în funcție de presiunea de infecție în intervalul de la 5 frunze până la sfârșitul înfloritului.
**Celelalte culturi:** THIOVIT JET 80 WG se aplică la apariția primelor simptome de boală sau la avertizare.
**Notă:** Intervalul între tratamente se adaptează în funcție de condițiile climatice și evoluția bolii.

**Toleranța culturii:** Anumite soiuri pot fi sensibile la sulf, în anumite condiții climatice. Se recomandă verificarea locală a toleranței în caz că produsul nu a mai fost folosit la cultura/soiul respectiv.

**Pregătirea soluției:** Se umple rezervorul mașinii de stropit la 1/4 - 1/3 cu apă, se pornește agitatorul, se adaugă cantitatea calculată și cântărită de THIOVIT JET 80 WG, se completează cu restul de apă, având grijă ca agitatorul să funcționeze în tot acest timp.
**Spălarea echipamentului:** După aplicare sau la sfârșitul zilei se va spăla echipamentul de stropire cu apă curată. Apa de spălare, ca și restul de soluție rămas, se diluează în raport de 1 la 10 cu apă curată și se aplică pe cultura tratată.

**Compatibilitate:** THIOVIT JET 80 WG poate fi amestecat cu numeroase produse de uz fitosanitar. Pentru siguranță se vor consulta tabelele de compatibilități. **NU SE VA AMESTECA PRODUSUL CU REGULATORI DE CREȘTERE!**

**Măsuri de igienă și protecție a muncii:** A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces al animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.
**Primul ajutor: Recomandare:** Păstrați recipientul produsului, eticheta sau Fișa cu date de securitate. Veți avea nevoie de acestea în cazul apelării numărului de urgențe Syngenta, contactării unui centru de informare toxicologică, a unui medic sau dacă mergeți pentru tratament.
**În caz de contact cu ochii:** Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Se vor îndepărta lentilele de contact. Este necesar un examen medical imediat.
**În cazul contactului cu pielea:** Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se va spăla imediat cu foarte multă apă. Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.
**În caz de inhalare:** Se va duce victima la aer proaspăt. În caz de respirație neregulată sau de stop respiratoriu se va aplica respirație artificială. Se va culca persoana respectivă și se va ține la căldură. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.
**În caz de înghițire:** A se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta. NU provocați voma.
**Sfat medical:** nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

**Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:**
Produse pentru stingerea incendiului - incendii minore :
Se va folosi apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, agent de stingere sub formă de pulbere sau dioxid de carbon.
Produse pentru stingerea incendiului - incendii majore :
Spumă rezistentă la alcooli sau apă pulverizată.
Nu se va folosi un jet de apă puternic care ar putea împrăștia și răspândi focul.
Deoarece produsul conține componente organice combustibile, un incendiu va produce un fum dens și negru conținând produși de combustie periculoși. Inhalarea de produși de descompunere periculoși poate determina probleme grave de sănătate.
Recomandări destinate pompierilor:
Se va purta îmbrăcăminte completă de protecție, precum și aparat respirator autonom.
Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.
Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise aflate în apropierea unor surse de incendiu.

**Măsuri de protecția mediului:** Nu se vor contamina apele de irigații sau de uz menajer și nici heleșteiele, șanțurile, sistemele de drenare etc. atunci când se elimină resturile de produs.

**Măsuri în caz de deversări accidentale:** Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare. În cazul unei împrăștieri accidentale, produsul se colectează utilizând un aspirator protejat electric sau prin periere umedă și se transferă într-un container pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale. Se va evita formarea unui nor de praf prin folosirea unei mături sau a aerului comprimat. Se va curăța cu grijă suprafața contaminată. Se va curăța cu detergenți. Se vor evita solvenții. Se va conserva și elimina apa de spălare contaminată. Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire, ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 (apel gratuit), adresă e-mail scapa@ecorecrecycling.ro sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

**Condiții de manipulare, depozitare și transport:** Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. Temperatura de depozitare între 0°C și +30°C.

**Notă:** Produsul este capabil de a forma nori de praf inflamabili în aer, care pot produce explozii. Sursele de aprindere pot fi: flăcările, suprafețele încinse și descărcările electrostatice. Echipamentul electric trebuie să fie compatibil cu caracteristicile de inflamabilitate ale acestui produs. A nu se manipula în prezența solvenților inflamabili. Urmele de solvenți inflamabili sporesc inflamabilitatea acestui produs. Țineți departe de surse de aprindere. În general, personalul care manipulează acest material, precum și toate echipamentele folosite trebuie să aibă împământare sau să fie legate la pământ. A se evita utilizarea materialelor plastice izolante. Sacii (FIBC) utilizați pentru a izola acest material trebuie să fie de tip C sau D. Sacii de tip C trebuie legați la pământ înainte ca pudra să fie încărcată sau descărcată din sac. Filtrele sacilor folosiți pentru a curăța praful din procesele de manipulare a materialului trebuie să fie conductibile și legate la pământ în timpul utilizării. Dacă pentru ambalarea acestui material se folosesc recipiente din metal sau fibră, asigurați-vă că părțile din metal sunt legate de echipamentul de umplere și legate la pământ.
Această substanță poate deveni ușor de încărcat în cele mai multe operațiuni. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.

**Termen de valabilitate:** Produsul este valabil 5 ani de la data fabricației, în condițiile de păstrare mai sus menționate, în ambalaje originale, închise etanș. Nu se va depozita la temperaturi mai mari de +30°C.

**În atenția utilizatorului:** Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice ale produselor. Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismelor rezistente. Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.
Relații suplimentare se pot obține de la Oficiile Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București, tel: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
© 2026 Syngenta Crop Protection AG

**În caz de urgență contactați:**
Spitalul Clinic de Urgență București
Adresa: Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București
Telefon de urgență:
+40 (21) 599 23 00
sau
021.112 (Apelabil 24h/7z)
E-mail: ati_2@urgentafloreasca.ro
sau
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu"
Adresa: Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, Bucuresti
Telefon de urgență: Tel: 021.210.62.82 ; Tel: 021.210.61.83
E-mail: contact@spitalulgrigorealexandrescu.ro
Sau
Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență:
Tel.: +(40 21) 529 25 77.